К ВОПРОСУ О СТЕПЕНИ РАДИКАЛЬНОСТИ УДАЛЕНИЯ ГЛИОМ СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

С.А. УСАТОВ, Б.Р. РАШИДИ, Ю.В. БОГУСЛАВСКИЙ

Луганский государственный медицинский университет, г. Рубежное, Украина

*Conflict of Interest Statement (We declare that we have no conflict of interest).

*Заява про конфлікт інтересів (Ми заявляємо, що у нас немає ніякого конфлікту інтересів).

*Заявление о конфликте интересов (Мы заявляем, что у нас нет никакого конфликта интересов).

*No human/animal subjects policy requirements or funding disclosures.

*Жодний із об'єктів дослідження (людина/тварина) не підпадає під вимоги політики щодо розкриття інформації фінансування.

*Ни один из объектов исследования не подпадает под политику раскрытия информации финансирования.

*Date of submission — 08.02.21

*Дата подачі рукопису — 08.02.21

*Дата подачи рукописи — 08.02.21

*Date of acceptance — 10.03.21

*Дата ухвалення — 10.03.21

*Дата одобрения к печати — 10.03.21

Цель работы – улучшить качество лечения больных с глиомами головного мозга супратенториальной локализации путем определения оптимальной хирургической тактики и показаний к разным видам оперативных вмешательств.

Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы результаты хирургического лечения 103 больных с глиомами супратенториальной локализации. Изучен анамнез больных. В динамике оценивали компьютерные и магнитно-резонансные томограммы. При операциях с воздействием на функциональные зоны головного мозга использовали метод «awake craniotomy».

Результаты. Проведены следующие операции с разным объемом удаления опухоли: биопсия, part resection (PR), subtotal resection (SR), near total resection (NTR), gross total resection (GTR). При проведении биопсии выявлены осложнения: кровоизлияния в структуру опухоли, увеличение отека, незначительные пластинчатые кровоизлияния. Гистологическая характеристика тканей при биопсии и открытом удалении не всегда совпадала. PR выполняли при росте опухоли в двигательных и речевых структурах головного мозга, для устранения дислокации и создания резервной полости, что целесообразно при медленно растущих доброкачественных новообразованиях. NTR и STR являются методом выбора, если глиомы частично располагаются в функционально значимых зонах. GTR использовали преимущественно при локализации опухоли в области полюсов лобной и височной долей, теменной области, чаще – справа. Срок жизни у 12,8 % больных после выполнения GTR превышал среднестатистические (более 5 лет).

Выводы. «Условно» радикальное удаление (STR, NTR, GTR) глиом головного мозга является оптимальным, поскольку увеличивает срок жизни больных даже при злокачествен-

ном характере заболевания. Применение метода «awake craniotomy» расширяет возможности при всех видах хирургического лечения, позволяя сохранить функционально значимые участки мозга. Использование биопсии не всегда оправдано, поскольку имеют место осложнения, а гистологическая характеристика структуры опухоли не всегда корректна.

Ключевые слова: глиомы; хирургическое лечение.

Перечень сокращений

GTR	Gross total resection
NTR	Near total resection
PR	Part resection
STR	Subtotal resection
КТ	Компьютерная томография
МРТ	Магнитно-резонансная томография

Глиомы головного мозга выявляют в 10,9–14,8 случая на 100 тыс. населения. На их долю приходится 50–55 % от всех первичных опухолей центральной нервной системы, причем 60 % из них являются злокачественными [1–11]. Основным критерием качества хирургического лечения этих новообразований является степень радикальности их удаления, от которой в основном зависит срок жизни больных [12–16]. Однако есть мнение, что удаление опухоли и изменений ткани за ее пределами может привести к неврологическому дефициту.

В хирургической тактике при глиомах необходимо стремиться к тотальному удалению, пока нет риска развития тяжелых неврологических осложнений [17].

Некоторые авторы являются сторонниками консервативного ведения данной группы больных. Комбинированная терапия, включающая химиотерапию, радиотерапию с применением линейного ускорителя или системы «Ciberknife», дает обнадеживающие результаты [18].

Однако в настоящее время хирургический метод лечения является приоритетным.

В данной работе рассмотрен вопрос об эффективности хирургического лечения в зависимости от объема удаления опухоли.

Цель работы – улучшить качество лечения больных с глиомами головного мозга супратенториальной локализации путем определения оптимальной хирургической тактики и показаний к разным видам оперативных вмешательств.

Материалы и методы

Ретроспективно проанализированы результаты хирургического лечения 103 больных с глиомами супратенториальной локализации.

Опухоли удаляли в объеме:

1. Биопсии.
2. Part resection (PR).
3. Subtotal resection (STR).
4. Near total resection (NTR).
5. Gross total resection (GTR).

При расположении опухоли вблизи функциональных зон использовали методику «awake craniotomy». До и после операции проводили обследования с использованием компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной (МРТ) томографии.

Результаты

Выполнено 11 биопсий глиальных опухолей головного мозга. Показанием к биопсии была необходимость забора опухолевой ткани для гистологического исследования с целью выяснения степени ее злокачественности, определения тактики лечения, уточнения чувствительности опухоли к химиотерапии, прогнозирования результатов лечения.

Нередко биопсию выполняют в случае выявления по данным МРТ и спиральной КТ опухоли головного мозга, не подлежащей удалению. Чаще всего это опухоли, прораста-

УСАТОВ Сергей Андреевич
проф., д-р. мед. наук, заведующий кафедрой
нейрохирургии травматологии и ортопедии з ЛФК
ТУ «Луганский государственный
медицинский университет»
Адрес: 93012, г. Рубежное, ул. Строителей, 32
Тел.: +38 (095) 706-41-89
E-mail: ysatovsergey@gmail.com
ORCID ID: 0000-0003-2026-7653

ющие в функционально значимые структуры, имеющие диффузно-инфильтративный тип роста, поражающие медиальные отделы и магистральные сосуды головного мозга.

Всем больным на 3-и–4-е сутки выполнена КТ. В 7 случаях зафиксированы осложнения: у 3 больных – кровотечение в паренхиму опухоли объемом от 10 до 25 см³, что сопровождалось нарастанием общемозгового синдрома и углублением неврологической симптоматики до 2–3 нед, у 2 пациентов – увеличение отека, что требовало назначения гормональной и дегидратационной терапии, еще у 2 больных в области фрезевого отверстия и по периферии от него имели место небольшие пластинчатые кровоизлияния объемом до 15 см³.

Позднее 5 из 11 больных были прооперированы открытым доступом. У 3 из 5 пациентов гистологическое заключение не совпало с заключением, полученным при биопсии, вероятно, из-за неоднородной структуры опухоли.

В литературе имеются сведения об ускорении роста и клинической манифестации опухоли после биопсии, поскольку хирургическая инвазия в опухолевую ткань может провоцировать клеточный митоз.

После биопсии 6 больным проводили только паллиативную терапию, включающую теле-γ-терапию и лечение темодалом. Из них у 5 гистологически была верифицирована глиобластома, у 1 – злокачественная астроцитома. Продолжительность их жизни после биопсии составляла от 4 до 8 мес.

Частичное удаление глиом головного мозга (PR) выполнено у 11 больных. Показания к PR устанавливали в основном во время оперативного вмешательства. Цель частичного удаления – максимальное продление срока жизни больных при сохранении неврологического дефицита на дооперационном уровне или улучшение статуса, уменьшение выраженности общемозгового синдрома. Этого достигают максимально возможным уменьшением объема опухоли, устранением дислокации и окклюзионной гидроцефалии. В 5 случаях PR комбинировали с ликворошунтирующими операциями (перфорацией III желудочка, вентрикуло-перитонеальным шунтированием).

PR выполняли в случае жесткой фиксации опухоли к магистральным сосудам головного мозга с прорастанием их стенок, что представляло угрозу их повреждения и развития ишемии, а также при инфильтрации опухо-

лью функциональных зон и жизненно важных центров. Особую роль в определении степени радикальности имеет методика «awake craniotomy», с помощью которой можно контролировать сохранение жизненно важных функций головного мозга, а, применяя интраоперационно пробу Матаса с помощью временных клипс Ясоргила, – дифференцировать опухолевые сосуды и сосуды, питающие функциональные зоны.

Срок жизни этих больных был несколько выше, чем при биопсии. При комбинации PR с использованием линейного ускорителя, «Ciber-knife» и современной химиотерапии (лечение темодалом) продолжительность жизни при глиомах 3-й степени злокачественности составляла в среднем ($2,5 \pm 1,7$) года, при опухолях 4-й степени – ($1,3 \pm 0,6$) года. Срок жизни у больных, которым выполняли PR, зависел от степени резекции опухолевой ткани.

По мнению многих нейрохирургов, тотальное удаление глиом головного мозга невозможно, поскольку часто наблюдается миграция опухолевых клеток по межклеточным пространствам от края опухоли на расстояние до 5–6 см, а в некоторых случаях – и на противоположную сторону. Эти клетки являются причиной рецидивов. Кроме того, особенно злокачественные опухоли в 90 % дают инфильтрацию по периферии.

Различают три вида условно-радикального удаления глиом:

1. STR-удаление 99 % объема опухоли. При контрольной МРТ выявляется опухолевая ткань, прилегающая к полости.
2. NTR-удаление всего объема опухоли, но при контрастировании отмечаются участки повышения плотности.
3. GTR-тотальное удаление опухоли в пределах неизменной ткани мозга с отсутствием накопления контраста на контрольных компьютерных томограммах.

Учитывая практически однотипные характеристики NTR и STR, при рассмотрении полученных результатов объединили эти два вида удаления. Группа состояла из 36 больных, у 19 из которых гистологически были верифицированы глиомы I–II степени злокачественности, у остальных – III–IV степени, то есть в последнюю группу включены злокачественные астроцитомы и глиобластомы (Grad III).

Чаще всего (у 85 % больных) NTR и STR выполняли при расположении опухоли в теменной, премоторной области и глубинных отделах больших полушарий головного мозга, то есть вблизи внутренней капсулы, поэтому проводить хирургические манипуляции в этих структурах было опасно, учитывая возможность развития грубого неврологического дефицита. При операциях у 11 больных использовали методику «awake craniotomy», которая позволяет удалить максимально возможный объем опухоли.

При расположении опухоли в передних отделах лобной и височной доли головного мозга (15 % пациентов) тотальному удалению препятствовало наличие неправильной формы опухолевого узла и выраженной инфильтрации опухолью перифокальной зоны.

Срок жизни у 23 больных с доброкачественными глиомами (I–II степени злокачественности) составлял в среднем $(3,9 \pm 1,5)$ года, у 15 пациентов с III–IV степенью злокачественности – $(2,3 \pm 1,7)$ года.

Другой вариант тотального удаления опухоли – GTR заключается в полном удалении опухоли в пределах неизмененного вещества мозга (визуально) и отсутствием на контрольных компьютерных томограммах накопления контраста в стенках послеоперационной полости.

Выполнены 39 операций при глиомах больших полушарий мозга с удалением опухоли в объеме GTR, из них у 21 больного верифицированы глиобластомы, у 18 – анапластические астроцитомы. В 15 случаях опухоли локализовались в лобно-полюсных отделах, в 12 – в височной доле головного мозга, в 3 – в теменно-затылочной области.

References

1. Glavackij OJa, Chepkij LP. Prognozuvannja jakosti zhyttja hvoryh z gliomamy supratentorialnoi lokalizacii pislja hirurgichnogo likuvannja. UNZh. 2007;3:28. (in Ukrainian) http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unkhj_2007_3_53
2. Zemskaja AG, Leshchinskij AG. Opuholi golovno mozga astrocitarnogo rjada. L.: Medicina; 1985. 214 p. (in Russian)
3. Zozulja JuA. Gliomy golovno mozga. Kiev; 2007. 236 p. (in Russian)
4. Losev JuA, Poljakov IV, Zablockij NU. Pervichnye opuholi golovno mozga – jepidemiologija, organizacija medicinskoj pomoshchi (po materialam Leningradskoj oblasti). Aktualnye voprosy klinicheskoi mediciny. SPb. 2003;1:35-40. (in Russian)
5. Oljushin VE, Ulitin AJu, Poljakov IV i dr. Epidemiologija pervichnyh opuholej v SPb. Hirurgija vnutricherepnyh jekstracerebralnyh opuholej. SPb.; 1997. P. 257-64. (in Russian)
6. Usatov SA. Issledovanie perifokalnoj zony gliom polusharij golovno mozga s celju optimizacii ih lechenija: Avtoref. dis. ... d-ra med. n. Kiev; 2002. 38 p. (in Russian)
7. Christensen HC, Kosteljanetz M, Johansen C. Incidences of gliomas and meningiomas in Denmark, 1943 to 1997. Neurosurgery. 2003;52(6):1327-34. PMID: 12762878 DOI: 10.1227/01.neu.0000064802.46759.53
8. Davis FG, Malinsky N, Haenszel W et al. Primary brain tumor incidence rates in four United States regions, 1985 1989: a pilot study. Neuroepidemiology. 1996;15(2):103-12. PMID: 8684582 DOI: 10.1159/000109895

Основным условием выполнения этих операций была удаленность опухоли от функциональных зон головного мозга. У 12 больных проведена субтотальная резекция доли головного мозга. В левом полушарии височную долю вместе с опухолью удаляли в пределах 2/3 ее объема. Сохранность речевых и двигательных зон мозга контролировали за счет wake-up анестезии.

При изучении срока жизни больных в этой группе, учитывая данные, приведенные другими авторами, мы выделили 4 возможных варианта выживаемости:

- 1) <1,5 года – 7 (17,9 %) больных (глиобластомы);
- 2) 1,6–2,5 года – 15 (38,5 %);
- 3) 2,6–5,0 лет – 12 (30,8 %);
- 4) >5,0 лет – 5 (12,8 %).

Полученные данные указывают на то, что при использовании GTR более 40 % больных проживают больше среднестатистических сроков.

Выводы

1. «Условно» радикальное удаление (STR, NTR, GTR) глиом головного мозга является оптимальным, поскольку увеличивает срок жизни больных даже при злокачественном характере заболевания.

2. Применение метода «awake craniotomy» расширяет возможности при всех видах хирургического лечения, позволяя сохранить функционально значимые участки мозга.

3. Использование биопсии не всегда оправдано, поскольку имеют место осложнения, а гистологическая характеристика структуры опухоли не всегда корректна.

9. Fleury A, Menegoz F, Grosclaude P et al. Descriptive epidemiology of cerebral gliomas in France. *Cancer*. 1997;79(6):1195-202. PMID: 9070498 DOI: 10.1002/(sici)1097-0142(19970315)79:6<1195::aid-cncr19>3.0.co;2-v
10. Forsyth PA, Roa WH. Primary central nervous system tumors in adults. *Curr Treat Options Neurol*. 1999;1(5):377-94. PMID: 11096723 DOI: 10.1007/s11940-996-0002-1
11. Wrensh MK, Minn Y, Bondy ML. Epidemiology. In: Bernstein M, and Berger MS (Eds.) *Neuro-Oncology: The Essentials*. New York: Thieme Medical Publishers, Inc.; 2000. P. 2-17.
12. Porsaev AI, Oljushin VE, Trofimova TN i dr. Vozmozhnosti sovremennykh metodov nejrovizualizatsii pri ocenke stepeni radikalnosti udalenija glialnykh supratentorialnykh opuholej. *Obzor literatury. Ros. nejrohir. zhurn. imeni prof. A.L. Polenova*. 2013;5(3):65-71. (in Russian)
13. Hentschel SJ, Sawaya R. Optimizing outcomes with maximal surgical resection of malignant gliomas. *Cancer Control*. 2003;10(2):109-14. PMID: 12712005 DOI: 10.1177/107327480301000202
14. Jeremic B. Radiation therapy with or without concurrent low-dose daily chemotherapy in locally advanced, nonmetastatic squamous cell carcinoma of the head and neck. *J Clin Oncol*. 2004;22(17):3540-8. PMID: 15337803 DOI: 10.1200/JCO.2004.10.076
15. Keles E, Chang EF, Kathleen R et al. Volumetric extent of resection and residual contrast enhancement on initial surgery as predictors of outcome in adult patients with hemispheric anaplastic astrocytoma. *J Neurosurg*. 2006;105(1):34-40. PMID: 16871879 DOI: 10.3171/jns.2006.105.1.34
16. Pignatti F, van den Bent M, Curran D et al. Prognostic factors for survival in adult patients with cerebral low-grade glioma. *J Clin Oncol*. 2002;20(8):2076-84. PMID: 11956268 DOI: 10.1200/JCO.2002.08.121
17. Sankar T, Moore NZ, Johnson J et al. Magnetic resonance imaging volumetric assessment of the extent of contrast enhancement and resection in oligodendrogial tumors. *J Neurosurg*. 2012;116(6):1172-81. PMID: 22424566 DOI: 10.3171/2012.2.JNS102032
18. Semenova VM, Glavackyj OJa. Himioterapija pry likuvanni hvoryh z gliomamy supratentorialnoi lokalizatsii, jiji vplyv na yakist zhyttja. *UNZh*. 2007;3:28. (in Ukrainian) http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unkhj_2007_3_542021

TO THE ISSUE OF DEGREE OF REMOVAL OF GLIOMAS OF SUPRATENTORIAL LOCALIZATION

S.A. USATOV, B.R. RASHIDI, YU.V. BOGUSLAVSKIY
Luhansk State Medical University, Rubizhne, Ukraine

Objective – to improve the quality of treatment of patients with supratentorially localized cerebral gliomas by determining the optimal surgical techniques and indications for various types of surgical procedures.

Materials and methods. The results of surgical treatment of 103 patients with gliomas of supratentorial localization were retrospectively analyzed. At the same time, the catamnesis of patients was studied as well as CT and MRI were evaluated in the dynamics. In operations affecting the functional areas of the brain the method of «awake craniotomy» was used.

Results. According to the volume of removal of tumours, the methods have been differentiated into biopsy, part resection (PR), subtotal resection (SR), near total resection (NTR), gross total resection (GTR). We used the method of «Awake craniotomy». In the dynamics, we did CT and MRT investigations. During biopsy, we discovered the following complications: haemorrhages into tumour structure, increase of the oedema, minor laminar haemorrhages. Histological characteristics of the tissues during biopsy and open removal were not always the same. PR was done in case of tumour growth in motor and speech structures of the brain, in order to eliminate the dislocation and create reserve cavity, which is advisable in case of slow-growing benign tumours. NTR and STR are a selection method when gliomas are partially situated in functionally meaningful regions. GTR are more often used if the tumour is localized in the regions of the poles of the frontal and temporal lobes, parietal lobe, more frequently to the right. The lifetimes of 12.8 % of these patients exceed the mean ones (more than 5 years).

Conclusions. Conditionally radical removal (STR, NTR, GTR) of cerebral gliomas is optimal, since it increases the life of patients even with a malignant nature of the disease. Application of the «awake craniotomy» method expands the possibilities for all types of surgical treatment, allowing to preserve functionally important areas of the brain. The use of a biopsy is not always justified, since there are complications, and the histological characteristics of the tumor structure is not always correct.

Key words: gliomas; surgical treatment.

ДО ПИТАННЯ ПРО СТУПІНЬ РАДИКАЛЬНОСТІ ВИДАЛЕННЯ ГЛІОМ СУПРА-ТЕНТОРІАЛЬНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ

С.А. УСАТОВ, Б.Р. РАШИДІ, Ю.В. БОГУСЛАВСЬКИЙ

Луганський державний медичний університет, м. Рубіжне, Україна

Мета роботи – поліпшити якість лікування хворих з гліомами головного мозку супратенторіальної локалізації шляхом визначення оптимальної хірургічної тактики та показань до різних видів оперативних втручань.

Матеріали та методи. Ретроспективно проаналізовано результати хірургічного лікування 103 хворих з гліомами супратенторіальної локалізації. Вивчено катамнез хворих. У динаміці оцінювали комп'ютерні та магнітно-резонансні томограми. Під час операцій з впливом на функціональні зони головного мозку використовували метод «awake craniotomy».

Результати. Проведено такі операції з різним обсягом видалення пухлини: біопсію, part resection (PR), subtotal resection (SR), near total resection (NTR), gross total resection (GTR). Під час проведення біопсії виявлено ускладнення: крововилив у структуру пухлини, збільшення набряку, незначні пластинчасті крововиливи. Гістологічна характеристика тканин при біопсії та відкритому видаленні не завжди збігалася. PR виконували при рості пухлини в рухових і мовленнєвих структурах головного мозку з метою усунення дислокації та створення резервної порожнини, що є доцільним при доброякісних новоутвореннях, які повільно ростуть. NTR і STR є методами вибору, якщо гліоми частково розташовуються у функціонально значущих зонах. GTR використовували переважно в разі локалізації пухлини в ділянці полюсів лобової та скроневої часток, тім'яної ділянки, частіше – справа. Строк життя у 12,8 % хворих після виконання GTR перевищував середньостатистичні (понад 5 років).

Висновки. «Умовно» радикальне видалення (STR, NTR, GTR) гліом головного мозку є оптимальним, оскільки збільшує термін життя хворих навіть при злоякісному характері захворювання. Застосування методу «awake craniotomy» розширює можливості при всіх видах хірургічного лікування, даючи змогу зберегти функціонально значущі ділянки мозку. Використання біопсії не завжди виправдано, оскільки мають місце ускладнення, а гістологічна характеристика структури пухлини не завжди коректна.

Ключові слова: гліоми; хірургічне лікування.