ЕНДОВАСКУЛЯРНЕ ТА МІКРОХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ СПІНАЛЬНИХ АРТЕРІОВЕНОЗНИХ МАЛЬФОРМАЦІЙ. НАШ ДОСВІД

Д.В. ЩЕГЛОВ, О.Є. СВИРИДЮК, А.В. НАЙДА,
Ю.М. САМОНЕНКО, О.В. СЛОБОДЯН

ДУ «Науково-практичний Центр ендovasкулярної нейрорентгенохірургії НАМН України», м. Київ

***Conflict of Interest Statement (We declare that we have no conflict of interest).**

*Заява про конфлікт інтересів (Ми заявляємо, що у нас немає ніякого конфлікту інтересів).

*Заявление о конфликте интересов (Мы заявляем, что у нас нет никакого конфликта интересов).

***No human/animal subjects policy requirements or funding disclosures.**

*Жодний із об'єктів дослідження (людина/тварина) не підпадає під вимоги політики щодо розкриття інформації фінансування.

*Ни один из объектов исследования не подпадает под политику раскрытия информации финансирования.

***Date of submission — 19.01.19**

*Дата подачі рукопису — 19.01.19

*Дата подачі рукопису — 19.01.19

***Date of acceptance — 13.02.19**

*Дата ухвалення — 13.02.19

*Дата одобрения к печати — 13.02.19

Мета роботи – підвищити якість лікування хворих з артеріовенозними мальформаціями (АВМ) спинного мозку.

Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз вибору методу лікування пацієнтів зі спінальними АВМ та отриманих результатів. У Центрі ендovasкулярної нейрорентгенохірургії НАМН України в період з 2005 до 2018 р. було прооперовано 55 хворих, з них 12 (21,8 %) – мікрохірургічним методом, 43 (78,2 %) – ендovasкулярним. Вік хворих становив від 11 до 62 років (середній вік – 45,3 року). Чоловіків було 34 (61,8 %), жінок – 21 (38,2 %). При ендovasкулярному втручанні застосовували рідкий емболізант, емболізант ціаноакрилатної групи і трансфеморальний доступ, при мікрохірургічному втручанні – задній серединний доступ та однорівневу геміламінектомію. У 36 (65,5 %) хворих виявлено АВМ I типу за класифікацією Anson і Spetzler (1992), у 10 (18,2 %) – АВМ II типу, у 5 (9,0 %) – АВМ III типу, у 4 (7,3 %) – АВМ IV типу. Для діагностики АВМ використовували магнітно-резонансну томографію та спінальну ангіографію. Тяжкість неврологічного дефіциту оцінювали за шкалою Atkinson-Logue. До ранніх післяопераційних ускладнень відносили лікворею, інфікування рани, післяопераційне неврологічне погіршення.

Результати. В обох групах летальних наслідків не зафіксовано. Тотальне виключення АВМ з кровотоку досягнуто у 33 (60 %) пацієнтів. Мікрохірургічне втручання було виконано у 9 (33 %) пацієнтах з АВМ I типу. Тотального роз'єднання спінальної АВФ досягли у 9 (100 %) пацієнтів, використавши мікрохірургічний метод. Раннє післяопераційне ускладнення (лікворею) зафіксовано в 1 (11 %) випадку. Із 27 (67 %) пацієнтів, котрі отримали ендovasкулярне лікування, у 17 (63 %) відзначено раннє транзиторне поглиблення неврологічного дефіциту. Повного роз'єднання артеріовенозної фістули досягнуто у 16 (59 %) пацієнтів. Емболізація

була методом вибору для пацієнтів з АВМ II типу (8 (80 %) випадків). Тотального виключення АВМ досягнуто у 5 (62,5 %) пацієнтів. У 6 (75 %) випадках спостерігали раннє післяопераційне погіршення неврологічних симптомів. Мікрохірургічний метод застосовано у 2 (20 %) випадках. АВМ виключено тотально у 2 пацієнтів, у 1 з них поглибився неврологічний дефіцит. Усіх пацієнтів з АВМ III типу прооперовано ендovasкулярно із застосуванням емболізатору ціаноакрилатної групи. АВМ була виключена тотально в 1 (20 %) випадку. Транзиторне поглиблення неврологічного дефіциту відзначено у 3 (60 %) пацієнтів. Ендovasкулярний метод було застосовано для лікування 3 (75 %) пацієнтів з АВМ IV типу. Тотальної емболізації досягнуто в 1 (33 %) спостереженні. Неврологічне погіршення мало місце в 1 (33 %) пацієнта.

Висновки. Ангіографія – золотий стандарт діагностики, який дає змогу визначити, який метод (ендovasкулярний та/або мікрохірургічний) є ефективним і безпечним для виключення АВМ. Застосування мікрохірургічних технік дає змогу тотально виключати АВМ у зв'язку з можливістю роз'єднання АВМ у ділянці артеріовенозного сполучення під контролем зору. У разі I типу АВМ неврологічне поліпшення відзначено наступної доби після операції в усіх пацієнтів, прооперованих мікрохірургічно. Ефективність, радикальність, вибір методу хірургічного лікування та рівень катетеризації артерії, яка живить, залежать від ангіоархітекtonіки АВМ. Основною умовою проведення емболізації є досягнення безпечного рівня катетеризації аферента. Мультиmodalний підхід із застосуванням ендovasкулярної та мікрохірургічної методик є найефективнішим при АВМ II і III типу.

Ключові слова: спінальна артеріовенозна мальформація; дуральна фістула; неврологічний дефіцит; спінальна ангіографія.

DOI 10.26683/2304-9359-2019-1(27)-32-40

Перелік скорочень

ALS	Aminoff-Logue Disability Scale
CSF	Cerebrospinal fluid
St.N.	Status neurologicus
ABM	Артеріовенозна мальформація
АВФ	Артеріовенозна фістула
MPT	Магнітно-резонансна томографія
САГ	Спінальна ангіографія

Спінальні артеріовенозні мальформації (АВМ) – це гетерогенна група непухлинних захворювань, які являють собою аномальне сплетення, в якому артерії прямо поєднані з венами через аномальне капілярне з'єднання. Артеріовенозна фістула (АВФ) – пряме сполучення між артерією та веною. На її частку припадає 3–4 % серед хвороб спинного мозку, які спричиняють неврологічний дефіцит

та призводять до неминучої інвалідизації [1]. За умови своєчасної діагностики лікування має позитивний клінічний ефект. При виборі методу лікування обов'язково враховують ступінь неврологічного дефіциту та результати спінальної ангіографії (САГ), зокрема особливості ангіоархітекtonіки. Тотальне виключення АВМ з кровотоку є ключовим моментом для запобігання прогресуванню неврологічного погіршення, однак метою лікування є функціональне збереження кровопостачання спинного мозку [2]. У деяких випадках зменшення потоку крізь шунти дає змогу полегшити симптоми [3–5]. Поєднання ендovasкулярних та мікрохірургічних технік дає змогу підвищити ефективність лікування пацієнтів зі спінальними АВМ [6].

САМОНЕНКО Юрій Михайлович

лікар-нейрохірург

ДУ «Науково-практичний Центр ендovasкулярної нейрохірургії НАМН України»

Адреса: 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32

Тел.: +38 (044) 483-32-17

E-mail: y.samonenko@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-2146-220X>

Мета роботи – підвищити якість лікування хворих з артеріовенозними мальформаціями (АВМ) спинного мозку.

Матеріали та методи

Проведено ретроспективний аналіз вибору методу лікування пацієнтів зі спінальними АВМ та отриманих результатів. У Центрі ендovasкулярної нейрорентгенохірургії НАМН України в період з 2005 до 2018 р. було прооперовано 55 хворих, з них 12 (21,8 %) – мікрохірургічним методом, 43 (78,2 %) – ендovasкулярним. У 36 (65,5 %) хворих виявлено АВМ І типу за класифікацією Anson і Spetzler (1992) [7], у 10 (18,2 %) – АВМ ІІ типу, у 5 (9,0 %) – АВМ ІІІ типу, у 4 (7,3 %) – АВМ ІV типу.

На етапі первинної діагностики спінальних АВМ використовували магнітно-резонансну томографію, на госпітальному етапі всім пацієнтам виконали селективну субтракційну САГ. Тяжкість неврологічного дефіциту до втручання та в ранній післяопераційний період оцінювали за шкалою Aminoff–Logue (ALS) [8]. Вивчали найчастіші ранні (в перші 10 днів після операції) ускладнення внаслідок застосування обох методів. При мікрохірургічному втручанні до ранніх післяопераційних ускладнень відносили лікворею, інфікування рани, поглиблення неврологічного дефіциту, при ендovasкулярному – поглиблення неврологічного дефіциту.

Ендovasкулярні втручання були виконані трансфеморальним дотупом із застосуванням мікрокатетерів Magic (Balton), клеючих композицій, та емболізату ціаноакрилатної групи, мікрохірургічні – з використанням заднього середнього доступу та однорівневої геміламінектомії.

Результати

При АВМ І типу застосовано обидва методи лікування. У 9 (33 %) випадках виконано мікрохірургічне роз'єднання АВФ, 27 (67 %) – ендovasкулярне.

У групі пролікованих мікрохірургічно зафіксовано 1 (11 %) випадок раннього післяопераційного ускладнення – ліквореї. При застосуванні ендovasкулярного методу в 17 (63 %) пацієнтів спостерігали транзиторне поглиблення неврологічного дефіциту.

Тотального роз'єднання спінальної АВМ досягнуто у групі, яка отримала мікрохірургічне лікування, і лише в 7 випадках при застосуванні ендovasкулярного методу. АВМ І типу були тотально виключені у 16 (59 %) пацієнтів.

Клінічний випадок № 1

Пацієнт віком 58 років звернувся зі скаргами на прогресуюче погіршення ходи та сечовипускання. St.N. оцінено 7 балами за ALS (4; 3). Проведено MPT і САГ. Діагностовано АВФ І типу (рис. 1, А, Б). Виконано мікрохірургічне роз'єднання АВМ. За даними селективної САГ (рис. 1, Г) досягнуто тотального виключення дуральної фістули. У ранній післяопераційний період St.N. оцінено 2 балами за ALS (1; 1).

Клінічний випадок № 2

Пацієнт віком 52 роки звернувся зі скаргами на прогресуюче погіршення ходи та сечовипускання. St.N оцінено 4 балами за ALS (3; 1). За даними селективної САГ (рис. 2, А) діагностовано АВФ І типу. Проведено емболізацію артерії, яка живить, клеєм групи ціаноакрилатів. За даними САГ (рис. 2, Б) досягнуто тотального виключення дуральної фістули. У ранній післяопераційний період відзначено незначне поглиблення неврологічного дефіциту (5 балів за ALS), а потім – регрес неврологічних симптомів (3 бали за ALS).

Для лікування пацієнтів з АВМ ІІ типу методом вибору є емболізація АВМ, оскільки хірургічне лікування, спрямоване на усунення гломусу зі спинного мозку, асоціюється зі значним ризиком поглиблення неврологічного дефіциту внаслідок інтраопераційного ушкодження функціонально значущих ділянок спинного мозку. Часто ангіоархитектоніка АВМ унеможливорює застосування мікрохірургічного методу. Виконано 8 (80 %) трансартеріальних емболізацій АВМ. Тотального виключення досягнуто у 5 (62,5 %) випадках. Ранні післяопераційні ускладнення (поглиблення неврологічного дефіциту) зафіксовані у 6 (75 %) пацієнтів. Мікрохірургічний метод застосували при низькому ризику ушкодження спинного мозку та/або поглиблення неврологічного дефіциту за рахунок об'єму АВМ у 2 (20 %) пацієнтів з групи. АВМ на рівні Th12–L2, L3 виключено тотально у 2 випадках. В 1 (50 %) пацієнта поглибився неврологічний дефіцит.

Рис. 1. Пацієнт з АВМ I типу: А – МРТ грудного відділу хребта: розширені звиті перимедулярні судини; Б – селективна спінальна ангіографія: на рівні L1–L2 візуалізовано артерію, яка живить артеріовенозну фістулу (біла стрілка) та відходить від лівої сегментарної артерії, і вену, котра дрениє (чорна стрілка); В – виконано мікrohrургічне роз'єднання артеріовенозної фістули; Г – післяопераційна селективна спінальна ангіографія. Досягнуто тотального виключення дуральної фістули (чорна стрілка)

Рис. 2. Пацієнт з АВМ I типу: А – селективна спінальна ангіографія: на рівні Th5–Th6 візуалізовано артерію (біла стрілка), яка живить та відходить від правої міжреберної артерії, і вену, котра дрениє (чорна стрілка); Б – досягнуто тотального виключення дуральної фістули (білі стрілки) завдяки дистальній катетеризації артерії, яка живить

У зв'язку з ангіоархітектонікою АВМ та феноменом артеріального обкрадання клінічне поліпшення в групі пацієнтів, прооперованих ендovasкулярно, не завжди залежало від тотальності емболізації АВМ.

Клінічний випадок № 3

Пацієнтка віком 11 років звернулася зі скаргами на раптову слабкість у ногах та порушення сечовипускання. St.N.: маніфестувала синдромом Фуа-Алажонін, 7 балів за ALS (5, 2). Проведено САГ (рис. 3, А). Виявлено АВМ II типу на рівні Th9–Th12. Виконано емболізацію із застосуванням емболізанта ціаноакрилатної групи. Досягнуто дистального відділу артерії, яка живить, та субтотального виключення гломусної АВМ (рис. 3, Б). Тотальне виключення АВМ асоціювалося з високим ризиком закриття спінальної артерії (ішемічного спінального інсульту).

Усіх пацієнтів з АВМ III типу прооперовано ендovasкулярно із застосуванням емболізату ціаноакрилатної групи. АВМ виключено тотально в 1 (20 %) пацієнта, що пов'язано з особливістю ангіоархітектоніки. Транзиторне поглиблення неврологічного дефіциту відзначено у 3 (60 %) пацієнтів.

Клінічний випадок № 4

Пацієнт віком 30 років звернувся зі скаргами на утруднення ходьби, затримку сечовипускання. St.N.: прогресуючий нижній парез 3 бали за ALS (1,2). За даними САГ діагностовано АВМ III типу (рис. 4, А). У просвіт судини встановлено мікрокатетер Magic, крізь який проведено суперселективну САГ під час емболізації емболізатом ціаноакрилатної групи (рис. 4, Б). АВМ виключено субтотально, заповнення відбувалося крізь сітку анастомозів з міжреберної артерії на рівні ThV–ThVI (рис. 4, Б). У післяопераційний період відзначено клінічно транзиторне поглиблення неврологічного дефіциту до 6 балів за ALS (4, 2).

У групі з IV типом АВМ 1 (25 %) пацієнта прооперовано відкритим методом. Не вдалося досягти стійкого неврологічного поліпшення, оскільки цей тип мальформації є прямим артеріовенозним сполученням на поверхні м'якої оболонки спинного мозку, що не має найдусу та має декілька привідних артерій. Під час мікрохірургічного втручання було виключено одну візуалізовану при САГ артерію, яка живить. При повторній САГ візуалізовано ще одну привідну артерію. Пацієнту не було

Рис. 3. Пацієнтка з АВМ II типу: А – селективна спінальна ангіографія: гломусна артеріовенозна мальформація на рівні Th9–Th12. Візуалізовано артерію, яка живить та є гілкою лівої міжреберної артерії на рівні Th9–Th10 (біла стрілка). Від неї також бере початок передня спінальна артерія; Б – спінальна ангіографія: досягнуто дистального відділу артерії, яка живить, і субтотального виключення гломусної артеріовенозної мальформації (чорна стрілка). Тотальне виключення артеріовенозної мальформації асоціювалося з високим ризиком закриття спінальної артерії (біла стрілка) (ішемічного спінального інсульту)

Рис. 4. Пацієнт з АВМ III типу: А – селективна спінальна ангіографія: візуалізовано артерію, яка живить та відходить від правої міжреберної артерії на рівні ThIV–ThV (біла стрілка); Б – під час емболізації в просвіті судини був мікрокатетер Magic (чорна стрілка), крізь який проведено суперселективну спінальну ангіографію;

В – спінальна ангіографія: артеріовенозну мальформацію виключено субтотально, заповнення відбувається крізь сітку анастомозів з міжреберної артерії на рівні ThV–ThVI

запропоновано ендоваскулярний метод лікування у зв'язку з ускладненим виконанням суперселективної САГ другої артерії, яка живить. Емболізацію співустя виконано з 3 (75 %) пацієнтам. АВМ виключено тотально в 1 (33 %) пацієнта, що пов'язано з наявністю декількох артерій, які живлять.

З огляду на особливість ангіоархітекtonіки АВМ досягнення безпечного рівня катетеризації всіх аферентів для проведення емболізації не завжди було можливим, оскільки асоціювалося з високим ризиком періопераційних ішемічних ускладнень. Неврологічне погіршення зафіксоване в 1 (33 %) пацієнта.

Обговорення

У дослідній групі було 36 (65,5 %) випадків АВМ I типу, що підтверджує дані про те, що дуральна фістула є найчастішою АВМ спинного мозку (70 % випадків судинної патології цієї локалізації) [9]. На нашу думку, для досягнення ефективного роз'єднання спінальних АВМ I типу доцільно використовувати обидва методи лікування, коригуючи підхід залежно від можливості селективної катетеризації співустя. Ми погоджуємося з Т. Krings та К. Jellema [9, 11], які стверджують, що облітерація дистальної порції вени, яка дренирує, є запорукою ефективності. Мікрохірургічне роз'єднання дає змогу досягти тотального виключення АВМ і не поглиблює неврологічний дефіцит у ранній післяопера-

ційний період. Цей метод є безпечним та високоефективним [10, 11].

Оскільки АВМ II типу локалізуються в паренхімі спинного мозку, мають одну або декілька артерій, які живлять і розміщені інтра- та/або перимедулярно, компактно та дифузно, вибір тактики лікування залежить від ангіоархітекtonіки АВМ [12, 13]. Методом вибору вважають ендоваскулярний [14, 15]. Повна ангіографічна облітерація АВМ не є обов'язковою. Мета лікування – зменшити об'єм шунтування та запобігти прогресуванню симптомів [3–5]. Ми поділяємо думку D.A. Wilson зі співавт., що за умови компактності АВМ та спричинення нею мас-ефекту доцільно використовувати комбіноване лікування або лише мікрохірургічне через високий ризик післяопераційного неврологічного дефіциту [18].

Ювенільні (метамерні) АВМ є складними для виключення ураженнями, при яких ендоваскулярний метод є найбільш прийнятним та часто єдиним можливим. Хірургічний метод має обмежене застосування у зв'язку з високим ризиком неконтрольованої кровотечі. Цей метод застосовують для тотального видалення АВМ або лише для її резекції. З огляду на локалізацію АВМ III типу метою лікування є усунення чи мінімізування симптомів шляхом керування феноменом судинного обкрадання, венозного повнокрів'я та усунення мас-ефекту, а не тотальне виключення мальформації [16, 17].

К.Т. Cho зі співавт. у серії з 19 пацієнтів дійшли висновку, що найкращого результату при АВМ IV типу, котрі мають одну або декілька розширених привідних артерій та розташовані поблизу *conus medullaris*, можна досягти у разі застосування мікрохірургічних технік. В інших випадках доцільно вивчити технічну можливість застосувати ендovasкулярний метод [18, 19]. На нашу думку, швидкий розвиток ендovasкулярних технік дасть змогу виключати цей тип АВМ трансартеріально.

Висновки

1. Ангіографія – золотий стандарт діагностики, який дає змогу визначити, який метод (ендovasкулярний та/або мікрохірургічний) є ефективним і безпечним для виключення АВМ.
2. Поява нових технік та інструментів для внутрішньосудинної нейрохірургії дає

змогу більш активно і з більшим ефектом використовувати ендovasкулярні методи в лікуванні АВМ.

3. Застосування мікрохірургічних технік дає змогу тотально виключати АВМ у зв'язку з можливістю роз'єднання АВМ у ділянці артеріовенозного сполучення під контролем зору. У разі I типу АВМ неврологічне поліпшення відзначено наступної доби після операції в усіх пацієнтів, прооперованих із застосуванням мікрохірургічної техніки.

4. Ефективність, радикальність, вибір методу хірургічного лікування та рівень катетеризації артерії, яка живить, залежать від ангіоархітектоніки АВМ. Основною умовою проведення емболізації є досягнення безпечного рівня катетеризації аферента.

5. Мультиmodalний підхід із застосуванням ендovasкулярної та мікрохірургічної методик є найефективнішим при АВМ II і III типу.

References

1. Bao YH, Ling F. Classification and therapeutic modalities of spinal vascular malformations in 80 patients. *Neurosurgery*. 1997 Jan;40(1):75-81. PMID:971827. <https://doi.org/10.1227/00006123-199701000-00017>.
2. Niizuma K, Endo T, Sato K, et al. Surgical treatment of spinal extradural arteriovenous fistula with parenchymal drainage: report on 5 cases. *Neurosurgery*. 2013 Dec;73(2 Suppl Operative):onsE287-93; discussion onsE293-4. doi: 10.1227/NEU.0000000000000189. PMID: 24077580.
3. Rodesch G, Hurth M, Alvarez H, et al. Embolization of spinal cord arteriovenous shunts: morphological and clinical follow-up and results – review of 69 consecutive cases. *Neurosurgery*. 2003 Jul;53(1):40-9; discussion 49-50. PMID: 12823872. <https://doi.org/10.1227/01.NEU.0000068701.25600.A1>.
4. Boström A, Krings T, Hans FJ, et al. Spinal glomus-type arteriovenous malformations: microsurgical treatment in 20 cases. *J Neurosurg Spine*. 2009 May;10(5):423-9. doi: 10.3171/2009.1.SPINE08355. PMID: 19442003.
5. Corkill RA, Mitsos AP, Molyneux AJ. Embolization of spinal intramedullary arteriovenous malformations using the liquid embolic agent, Onyx: a single-center experience in a series of 17 patients. *J Neurosurg Spine*. 2007 Nov;7(5):478-85. PMID: 17977188. doi: 10.3171/SPI-07/11/478.
6. Endo T, Endo H, Sato K, Matsumoto Y, Tominaga T. Surgical and endovascular treatment for spinal arteriovenous malformations. *Neurol Med Chir (Tokyo)*. 2016 Aug 15;56(8):457-64. doi: 10.2176/nmc.ra.2015-0327. Epub 2016 Mar 4. Review. PMID: 26948701; PMCID: PMC4987445.
7. Anson JA, Spetzler RF. Classification of spinal arteriovenous malformations and implications for treatment. *BNI Quarterly*. 1992;8:2-8.
8. Aminoff MJ, Logue V. The prognosis of patients with spinal vascular malformations. *Brain*. 1974 Mar;97(1):211-8. PMID: 4434169. doi: 10.1093/brain/97.1.211.
9. Krings T. Vascular malformations of the spine and spinal cord. *Clin Neuroradiol*. 2010 Mar;20(1):5-24. doi:10.1007/s00062-010-9036-6.
10. Krings T, Mull M, Gilsbach JM, Thron A. Spinal vascular malformations. *Eur Radiol*. 2005 Feb;15(2):267-78. Review. PMID: 15538580. DOI: 10.1007/s00330-004-2510-2.
11. Jellema K, Sluzewski M, van Rooij WJ, et al. Embolization of spinal dural arteriovenous fistulas: importance of occlusion of the draining vein. *J Neurosurg Spine*. 2005 May;2(5):580-3. PMID: 15945432. DOI: 10.3171/spi.2005.2.5.0580.
12. Rosenblum B, Oldfield EH, Doppman JL, Di Chiro G. Spinal arteriovenous malformations: a comparison of dural arteriovenous fistulas and intradural AVM's in 81 patients. *J Neurosurg*. 1987 Dec;67(6):795-802. PMID: 3681418. DOI: 10.3171/jns.1987.67.6.0795.
13. Heros RC, Debrun GM, Ojemann RG, et al. Direct spinal arteriovenous fistula: a new type of spinal AVM. Case report. *J Neurosurg*. 1986 Jan;64(1):134-9. PMID: 3941336. DOI: 10.3171/jns.1986.64.1.0134.
14. Krings T, Thron AK, Geibprasert S, et al. Endovascular management of spinal vascular malformations. *Neurosurg Rev*. 2010 Jan;33(1):1-9. doi: 10.1007/s10143-009-0204-6. Review. PMID: 19415356.
15. Biondi A, Merland JJ, Reizine D, et al. Embolization with particles in thoracic intramedullary arteriovenous malformations: long-term angiographic and clinical results. *Radiology*. 1990 Dec;177(3):651-8. PMID: 2243964. doi: 10.1148/radiology.177.3.2243964.
16. Spetzler RF, Zabramski JM, Flom RA. Management of juvenile spinal AVM's by embolization and operative excision. Case report. *J Neurosurg*. 1989

- Apr;70(4):628-32. PubMed PMID: 2647920. DOI: 10.3171/jns.1989.70.4.0628.
17. Touho H, Karasawa J, Shishido H, et al. Successful excision of a juvenile-type spinal arteriovenous malformation following intraoperative embolization. Case report. J Neurosurg. 1991 Oct;75(4):647-51. PMID: 1885985. doi: 10.3171/jns.1991.75.4.0647.
 18. Wilson DA, Abila AA, Uschold TD, et al. Multimodality treatment of conus medullaris arteriovenous malformations: 2 decades of experience with combined endovascular and microsurgical treatments. Neurosurgery. 2012 Jul;71(1):100-8. doi: 10.1227/NEU.0b013e318256c042. PMID: 22472551.
 19. Cho KT, Lee DY, Chung CK, et al. Treatment of spinal cord perimedullary arteriovenous fistula: embolization versus surgery. Neurosurgery. 2005 Feb;56(2):232-41; Review. PMID: 15670371. doi: 10.1227/01.neu.0000147974.79671.83.

ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ И МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СПИНАЛЬНЫХ АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ. НАШ ОПЫТ

Д.В. ЩЕГЛОВ, О.Е. СВИРИДЮК, А.В. НАЙДА, Ю.М. САМОНЕНКО, О.В. СЛОБОДЯН
ГУ «Научно-практический Центр эндоваскулярной нейрорентгенохирургии НАМН Украины», г. Киев

Цель работы – повысить качество лечения больных с артериовенозными мальформациями (АВМ) спинного мозга.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ выбора метода лечения пациентов со спинальными АВМ и полученных результатов. В Центре эндоваскулярной нейрорентгенохирургии НАМН Украины в период с 2005 по 2018 г. прооперировали 55 больных, из них 12 (21,8 %) – микрохирургическим методом, 43 (78,2 %) – эндоваскулярным. Возраст больных составлял от 11 до 62 лет (средний возраст – 45,3 года). Мужчин было 34 (61,8 %), женщин – 21 (38,2 %). При эндоваскулярном вмешательстве применяли жидкий эмболизант, эмболизант цианоакрилатной группы и трансфеморальный доступ, при микрохирургическом вмешательстве – задний срединный доступ и одноуровневую гемиламинэктомию. У 36 (65,5 %) больных обнаружена АВМ I типа по классификации Anson и Spetzler (1992), у 10 (18,2 %) – АВМ II типа, у 5 (9,0 %) – АВМ III типа, у 4 (7,3 %) – АВМ IV типа. Для диагностики АВМ использовали магнитно-резонансную томографию и спинальную ангиографию. Тяжесть неврологического дефицита оценивали по шкале Aminoff–Logue. К ранним послеоперационным осложнениям относили ликворею, инфицирование раны, послеоперационное неврологическое ухудшение.

Результаты. В обеих группах летальные исходы не зафиксированы. Тотальное выключение АВМ из кровотока достигнуто у 33 (60 %) пациентов. Микрохирургические вмешательства были выполнены у 9 (33 %) пациентам с АВМ I типа. Тотального разъединения спинальной АВФ достигли у 9 (100 %) пациентов. Раннее послеоперационное осложнение (ликворея) зафиксировано в 1 (11 %) случае. Из 27 (67 %) пациентов, получивших эндоваскулярное лечение, у 17 (63 %) отмечено раннее транзиторное углубление неврологического дефицита. Полное разъединение артериовенозной фистулы достигнуто у 16 (59 %) пациентов. Эмболизация была методом выбора для пациентов с АВМ II типа (8 (80 %) случаев). Тотальное выключение АВМ достигнуто у 5 (62,5 %) пациентов. В 6 (75 %) случаях наблюдали раннее послеоперационное ухудшение неврологических симптомов. Микрохирургический метод применен в 2 (20 %) случаях. АВМ выключена тотально у 2 пациентов, у 1 из них углубился неврологический дефицит. Всех пациентов с АВМ III типа прооперировали эндоваскулярно с применением эмболизата цианоакрилатной группы. АВМ была выключена тотально в 1 (20 %) случае. Транзиторное углубление неврологического дефицита отмечено у 3 (60 %) пациентов. Эндоваскулярный метод был применен для лечения 3 (75 %) пациентов с АВМ IV типа. Тотальная эмболизация достигнута в 1 (33 %) наблюдении. Неврологическое ухудшение имело место у 1 (33 %) пациента.

Выводы. Ангиография – золотой стандарт диагностики, позволяющий определить, какой метод (эндоваскулярный и/или микрохирургический) является эффективным и безопасным для выключения АВМ. Применение микрохирургической техники позволяет тотально выключать АВМ в связи с возможностью разъединения АВМ в области артериовенозного сообщения

под контролем зрения. В случае I типа АВМ неврологическое улучшение отмечено на следующие сутки после операции у всех пациентов, прооперированных с применением микрохирургической техники. Эффективность, радикальность, выбор метода хирургического лечения и уровень катетеризации питающей артерии зависят от ангиоархитектоники АВМ. Основным условием проведения эмболизации является достижение безопасного уровня катетеризации афферентов. Мультимодальный подход с применением эндоваскулярной и микрохирургической методик является эффективным при АВМ II и III типа.

Ключевые слова: спинальная артериовенозная мальформация; дуральная фистула; неврологический дефицит; спинальная ангиография.

ENDOVASCULAR AND MICROSURGICAL TREATMENT FOR SPINAL ARTERIOVENOUS MALFORMATIONS. OUR EXPERIENCE

D.V. SHCHEHLOV, O.E. SVIRIDYUK, A.V. NAIDA, Yu.M. SAMONENKO, O.V. SLOBODIAN
SO «Scientific-practical Center of endovascular neuroradiology NAMS of Ukraine», Kyiv

Objective – to improve the treatment quality for patients with spinal arteriovenous malformations (AVM).

Materials and methods. A retrospective analysis of endovascular and surgical treatment of patients was made. In SO «Scientific-practical Center of endovascular neuroradiology NAMS of Ukraine» since 2005 till 2018 were operated 55 patients (34 (61.8 %) men and 21 (38.2 %) women). The age of patients ranged from 11 to 62 years (middle age is 45.3 years). The classification proposed by Anson and Spetzler in 1992 was used in order to divide patients into experimental groups: type I, arteriovenous fistula (AVF); type II, glomus intramedullary AVM; type III, juvenile AVM; and type IV, perimedullary AVF. Patients with type I were 36 (65.5 %), with II type – 10 (18.2 %), with III type – 5 (9.0 %), with IV type – 4 (7.3 %). For diagnostics were used MRI and spinal angiography. The Aminoff–Logue scale was used for assessment of the neurological deficiency severity. Early postoperative complications (CSF) leakage, wound infection, early postoperative worsening) were counted.

Results. 12 (21.8 %) patients were treated using the microsurgical method and 43 (78.2 %) were treated endovascular. We used endovascular and microsurgical methods to treat patients with I type spinal AVM. Microsurgical intervention for 9 (33 %) patients was performed. Complete disconnection of fistula was achieved in 9 patients. Early postoperative complication (CSF leakage) was observed in 1 (11 %) case. Endovascular treatment was performed for 27 (67 %) patients. Total disconnection was achieved in 16 (59 %) cases, 17 patients (63 %) had early transient neurological worsening. Embolization is the first-line treatment for patients with type II AVM – 8 (80 %) patients. Complete obliteration of AVM was attained in 5 patients (62.5 %), 6 (75 %) patients suffered from early worsening of postoperative neurological symptoms. The microsurgical method was used in case of low risk of spinal cord injury in 2 patients (20 %), AVMs were excluded totally in 2 patients and in 1 patient neurological deterioration was stabilized. All patients with III type AVM were treated endovascular. AVM was obliterated complete in 1 patient (20 %). Three (60 %) patients had transient neurological deterioration. Endovascular method was used to treat 3 (75 %) patients with type IV AVM. Totally disconnection of AVM was achieved in 1 (33 %) patient. Super-selective catheterization of all conductive arteries was not possible. Neurological worsening was observed in 1 (33 %) patient.

Conclusions. Angiography is the first-line diagnostic method which permits to find the most effective and safe way (endovascular or/and microsurgical treatment) to disconnect AVM from spinal cord bloodstream. Microsurgical intervention helps to achieve eye-controlled total arteriovenous disconnection. Microsurgical technique usage leads to good neurological results – neurological improvement the following day after surgery in all cases of AVM type I treatment. The structure of AVM determines effectiveness, radicality, method of treatment and the level of feeder artery catheterization. The main goal of embolization to achieve the safe catheterization level of the afferent. Multimodal treatment, which includes endovascular and microsurgical methods, is the most effective in case of AVM II and III types.

Key words: spinal arteriovenous malformation; dural fistula; neurological deterioration; spinal angiography.